農桑輯要

農桑輯要卷第六

竹木

種竹

齊民要術 宜高平之地（近山阜尤是所宜下田得水即死）黃白軟土為良正月二月中斸取西南引根并莖芟去葉於園內東北角種之令坑深二尺許覆土厚五寸（竹性愛向西南引故於園東北角種之數歲之後自當滿園諺云東家種竹西家治地為滋蔓而來生也其居東北角者老竹種不生生亦不能滋茂故須取其西南引少根

也

稻麥糠糞之二糠各自堪糞不令和雜不用水澆澆則淹死勿令六畜入園三月食淡竹筍四月五月食苦竹筍其欲作器者經年乃堪殺未經年者軟未成也

四時類要移竹五月十三日及辰日可以以移之○種竹去梢葉作稀泥於阬中下竹栽以土覆之杵築定勿令脚踏土厚五寸竹忌手把及洗手面脂水澆著即枯死

博聞錄月菴種竹法深闊掘溝以乾馬糞和細泥填高一尺無馬糞礱糠亦得夏月稀冬月稠然後種竹須三四莖作一蔟亦須土鬆淺種不可增土於株上泥若用钁打實則不生筍○夢溪云種竹但林外取向陽者向北而栽蓋根無不向南必用雨下遇火日及有西風則不可花木亦然諺云栽竹無時雨下便移多留宿土記取南枝○志林云竹有

雌雄雌者多笋故種竹常擇雌者物不逃於陰陽可不信哉凡欲識雌雄當自根上第一枝觀之有雙枝者乃爲雌竹獨枝者爲雄竹○竹有花輙槁死花結實如稗謂之竹米一竿如此久之則舉林皆然其治之法於初米時擇一竿稍大者截去近根三尺許通其節以糞實之則止○瑣碎錄云引笋法隔籬埋貍或猫於牆下明年笋自迸出○竹以三

伏內及臘月中斫者不蛀一云用血忌日

松 杉柏檜附

齊民要術 崔寔曰正月自朔暨晦可移松柏桐梓竹漆諸樹

博聞錄 栽松春社前帶土栽培百株百活舍此時決無生理也○斫松木須五更初便削去皮則無白蟻血忌日尤好○插杉用驚蟄前後五日斬新枝斸阬入枝下泥杵緊相視天陰即插遇雨十

分生無雨即有分数

新添 種松柏八九月中擇成熟松子子（柏子同）去臺收頓至来春春分時甜水浸子十日治畦下水上糞湯散子於畦内如種菜法或單排點種上覆土厚二指許畦上搭矮棚蔽日旱則頻澆常須濕潤至秋後去棚長高四五寸十月中夾籬稭籬以禦北風畦内亂撒麦糠覆樹令梢上厚二三寸上（南方宜敞盖）至穀雨前後

手爬去麦糠澆之次冬封蓋亦如此二年之後三月中帶土移栽先撅區用糞土相合內區中水調成稀泥植栽於內擁土令區滿下水塌實無用杵築脚踏次日有裂縫處以脚躡合常澆令濕至十月祛倒以土覆藏毋使露樹至春去土次年不須覆栽大樹者於三月中移廣留根土謂如一丈樹留土方三尺地遠移者二尺五寸一丈五尺樹留土三尺或三尺五寸用草繩纏束根土樹大者從下剌去

枝三二層樹記南北運至區所栽如前法
檜種如松法插枝者二三月檜芽孽動
時先熟劚黃土地成畦下水飲畦一徧
滲定再下水候成泥將斫下細如小指
檜枝長一尺五寸許下削成馬耳狀先
以杖刺泥成孔插檜枝於孔中深五七
寸以上栽宜稠密常澆令潤澤上搭矮
棚蔽日至冬換作暖廕次年二三月去
之候樹高移栽如松柏法

榆

齊民要術榆性扇地其陰下五穀不植隨其高下廣狹東西北三方所扇各與樹等種者宜於園地北畔秋耕令熟至春榆莢落時收取漫散犂細畤勞之明年正月初附地芟殺以草覆上放火燒之一根上必十數條俱生止留一根強者餘悉掐去之一歲之中長八九尺矣不燒則長遲也後年正月二月移栽之初生即移者喜曲故須藂林長之三年乃可移種初生三年不用採葉尤忌捋

心將心則科茹不長更須依法燒之則依前茂矣不用剝沐剝者長而細又多瘢痕不剝雖短麤而無病諺曰不剝不沐十年成轂言易麤也必欲剝者宜留二寸於壍坑中種者以陳屋草布壍中散榆莢於草上以土覆之燒亦如法陳草速朽肥良勝糞無陳草者用糞糞之亦佳不糞雖生而瘦既栽移者燒亦如法○又種榆法其於地畔種者致雀損穀既非叢林率多曲戾不如割地一方種之其白土薄地不宜五穀者惟宜榆及白榆地須近市賣柴莢葉省功梜榆刺榆

凡榆三種色別種之勿令和雜（梜榆莢葉味苦）（凡榆莢味甘甘者春時將煮賣是以須別也）耕地收莢一如前法先耕地作壠然後散榆莢（壠者看好科理）（又易五寸一莢稀穊得中）散訖勞之榆生共草俱長未須科理明年正月附地芟殺放火燒之亦任生長勿使棠（杜康反）近又至明年正月斸去惡者其一株上有七八根生者悉皆斫去惟留一根麤直好者三年春可將莢葉賣之五年之後便堪作椽

不梜者即可斫賣梜者鏇作獨樂及盞十年之後魁椀瓶榼器皿無所不任十五年後中為車轂及蒲桃缸○崔寔曰二月榆莢成及青收乾以為旨蓄旨美也蓄積也收青莢小蒸曝之至冬以釀酒滑香宜養老詩云我有旨蓄亦以御冬色變白將落可作醬醶醬音牟醶音頭榆醬隨節早晏勿失其適

務本新書榆葉曝乾擣羅為末鹽水調勻日中炙曝天寒於火上熬過拌菜食

之味頗辛美

白楊

齊民要術白楊一名高飛一名獨搖性甚勁直堪為屋材折則折矣終不曲橈奴孝反橈性軟久無不曲比之白楊不如遠矣且天性多曲脩直者少長又遲緩積年方得凡屋材松柏為上白楊次之榆為下也○種白楊法秋耕令熟至正月二月中以犂作壠一壠之中以犁逆順各一到畼中寬狹正似葱壠作訖又以鍬掘底一阬作小壍斫取白楊

枝大如指長三尺者屈著壠中以土壓上令兩頭出土向上直豎二尺一株明年正月剶去惡枝一畝三壠一壠七百二十株一根兩株一畝四千三百二十株三年中為蠶樀（都格反 蠶椽）五年任為屋椽十年堪為棟梁歲種三十畝三年九十畝一年賣三十畝周而復始永世無窮比之農夫勞逸萬倍去山遠者實宜多種千根以上所求必備

棠

齊民要術棠熟時收種之否則春月移栽八月初天晴時摘葉薄布曬令乾可以染絳必候天晴時少摘葉乾之復更摘慎勿頓收若遇陰雨則浥浥不堪染絳也

穀楮

齊民要術說文云穀者楮也按今世人乃有名之曰角楮非也蓋角穀聲相近因訛耳其皮可以為紙者也楮宜澗谷間種之地欲極良秋上候楮子熟時多收淨淘

曝令燥耕地令熟二月耬耩之和麻子漫散之即勞秋冬仍留麻勿刈為楮作暖（若不和麻子種率多凍死）明年正月初附地芟殺放火燒之一歲即沒人（不燒者瘦而長亦遲）三年便中斫（未滿三年者皮薄不任用）斫法十二月為上四月次之（非此兩月而斫者楮多枯死也）每歲正月常放火燒之（自有乾葉在地足得火燃不燒則不滋茂也）二月中間斸去惡根移栽者二月蒔之亦三年一斫（三年不斫者徒失錢無益也）指地賣者省功

而利少煮剝賣皮者雖勞而利大其柴足以供然自能造紙其利又多種三十畝者歲斫十畝三年一徧歲收絹百疋

槐

槐子熟時多收擘取數曝勿令蟲生五月夏至前十餘日以水浸之六七日如浸麻子法當芽生好雨種麻時和麻子撒之當年之中即與麻齊麻熟刈去獨留槐槐既細長不能自立根別竪

木以繩欄之冬天多風雨繩欄宜以茅裹不則傷皮成痕瘢也明年斸地令熟還於槐下種麻脅槐令長三年正月移而植之亭亭條直千百若一所謂蓬生麻中不扶自立若隨宜取栽匪直長遲樹亦曲惡宜於園中剷地種之

柳

種柳正月二月中取弱柳枝大如臂長一尺半燒下頭二三寸埋之令沒常足水以澆之必數條俱生留一

根茂者（餘悉掐去）別豎一柱以為依主以繩攔之（若不攔必為風所摧不能自立）一年中即高一丈餘其旁生枝葉即掐去令直聳上高下任人取足便掐去正心即四散下垂婀娜可愛（若不掐心則枝不四散或邪或曲生亦不佳也）六七月中取春生少枝種則長倍疾（少枝葉青氣壯故長疾也）

○楊柳下田停水之處不得五穀者可以種柳八月九月中水盡燥濕得所時急耕則鎘榛之至明年四月又耕熟

勿令有堁即作暘壠一畝三壠一壠之中逆順各一到暘中寬狹正似葱壠從五月初盡七月末每天雨時即觸雨折取春生少枝長一尺已上者插著壠中二尺一根數日即生少枝長疾三歲成椽比如餘木雖微脆亦足堪事歲種三十畝三年種九十畝歲賣三十畝終歲無窮○憑柳可以為楯車輞雜材及枕○種箕柳去山澗河旁及下田不得五穀之

處水盡乾時熟耕數徧至春凍釋於山陂河坎之旁刈取箕柳三寸栽之漫散即勞勞訖引水停之至秋任為簸箕山柳赤而脆河柳白而明○陶朱公術曰種柳千樹則足柴十年以後髡一樹得一載歲髡二百樹五年一周

四時類要種柳取青嫩枝如臂長六七尺燒下三二寸埋二尺以上

博聞錄楊柳根下先種大蒜一枚不生

蟲

楸

齊民要術 楸詩義疏曰梓楸之踈理色白而生子者為梓說文曰檟楸也然則楸梓二木相類者也白色有角者名為梓以楸有角者名為角楸或名子楸黃色無子者為柳楸世人見其木黃呼為荊黃楸也亦宜割地一方種之梓楸各別無令和雜楸既無子可於大樹四面掘作阬取栽移之方兩步一根兩畝一行一行百二十樹五行合六百樹十年後車板盤合樂器

所在任用以爲棺材勝於松柏

梓

齊民要術 種梓法秋耕地令熟秋末冬初梓角熟時摘取曝乾打取子耕地作壟漫田即再勞之明年春生有草拔令去勿使荒沒後年正月間斸移之方兩步一樹此樹須大不能概栽

梧桐

齊民要術 梧桐桐葉花而不實者曰白桐實而皮青者曰梧桐

按今人以其皮青號曰青桐也青桐九月收子二三月中作一步圓畦種之方大則難裹所以須圓小治畦下水一如葵法五寸下一子少與熟糞和土覆之生後數澆令潤澤此木宜濕故也當歲即高一丈至冬豎草於樹間令滿外復以草圍之以葛十道束置不然則凍死也明年三月中移植於廳齋之前華淨妍雅極為可愛後年冬不須復裹成樹之後樹別下子一石子於葉上生多者五六少者二三也炒食

甚美味似蔓菁多噉亦無妨白桐無子冬結似子者乃是明年之花房亦遶大樹掘阬取栽移之成樹之後任爲樂器青桐則不中用於山石之間生者樂器則鳴青白二材並堪車板盤合木屧等用

漆

新添 春分前後移栽後樹高六七月以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆

柞

爾雅云栩杼也注云柞樹按俗人呼杼為橡子以橡殼為杼斗以剜剜似斗故也橡子儉歲可食以為飯豐年放豬食之可以致肥也

宜於山阜之曲三徧熟耕漫散橡子即再勞之生則薅治常令淨潔一定不移十年中椽可雜用二十歲中屋樽斫去尋生科理還復凡為家具者前件木皆所宜種十歲之後無求不給

皂莢

博聞錄 樹不結鑿一大孔入生鐵三五斤以泥封之便開花結子既實以篾束其本數匝木楔之一夕自落

新添 種者二三月種不結角者南北二面去地一尺鑽孔用木釘釘之泥封寂即結

楝

新添 子熟時兩後種如種桃李法成樹移栽

椿

新添 木實而葉香有鳳眼草者謂之椿木踈而氣臭無鳳眼草者謂之樗皆可於春分前後栽之又云有花而荚者謂樗無花不實謂椿

葦 附荻

新添 葦四月苗高尺許選好家葦連根栽成土墩如椀口大於下濕地内掘區栽之縱横相去一二尺欲疾得力則寒栽至冬

放火燒過次年春芽出便成好葦十月後刈之一法二月熟耕地作壠取根卧栽以土覆之次年成葦○又壓栽法其葦長時掘地成渠將莖袪倒以土壓之露其梢凡葉向上者亦植令出土下便生根上便成笋與壓栽無異五年之後根交當隔一尺許斸一钁即滋旺矣

荻栽與葦同

蒲

新添四月揀綿蒲肥旺者廣帶根泥移出於水地內栽之次年即堪用其水深者白長水淺者白短

作園籬

齊民要術凡作園籬法於牆基之所方整深耕凡耕作三壟中間相去各二尺秋上酸棗熟時收於壟中概種之至明年秋生高三尺許間劚去惡者相去一尺留一根必須稀概均調行伍條直相

當至明年春剶（敕傳反）去橫枝剶必留距（若不留距侵皮痕大逢寒即死）剶訖即編爲巴籬隨宜夾縛務使舒緩（急則不復得長故也）又至明年春更剶其末又復編之高七尺便足（欲高作者亦任人意）枳棘之籬折柳樊圃斯其義也其種柳作之者一尺一樹初即斜插插時即編其種榆莢者一同酸棗如其栽榆與柳斜植高共人等然後編之數年成長共相蹙迫交柯錯葉特似房櫳

諸樹

齊民要術 凡栽一切樹木欲記其陰陽不令轉易（陰陽易位則難生小小栽者不煩記也）大樹髡之（不髡風搖則死）小則不髡先為深阬內樹訖以水沃之著土令如薄泥東西南北搖之良久（搖則泥入根間無不活者不搖根虛多死其小樹則不煩耳）然後下土堅築（近上三寸不築取其柔潤也）時時溉灌常令潤澤（每澆水盡即以燥土覆之覆則保澤不然即乾）埋之欲深勿令撓動凡栽樹訖皆不用手

捉及六畜觝突戰國策曰夫柳縱橫顛倒樹之皆生使千人樹之一人搖之則無生柳矣○凡栽樹正月為上時諺曰正月可栽大樹言得時則易生也二月為中時三月為下時然棗雞口槐兔目桑蝦蟆眼榆負瘤散自餘雜木鼠耳虻翅各其時此等名即皆是葉生形容之所象似以此時栽種者葉皆即生早栽者葉晚出雖然大率寧早為佳不可晚也○樹大率種數既多不可一一脩舉凡不見者栽蒔之法皆求之此條○崔寔曰二月盡三月可掩樹枝埋樹

枝土中令生二歲已上可移種矣

務本新書

一切栽枝記南北根深土遠寬掘上以席包包裹不令見日大車上般載以人擡曳緩緩而行車前數百步平治路上車轍務要平坦不令車輪搖擺於處所依法栽培樹樹決活古人有云移樹無時莫令樹知區宜寬深以水攪土成泥仍糝新粟大麥百餘粒即下樹栽樹大者須以木扶架若根不動搖雖

丈許之木可活仍須芟去繁枝不可招風

伐木

齊民要術凡伐木四月七月則不蟲而堅韌凡木有子實者候其子實將熟皆其時也非其時者蟲而且脆也○凡非時之木水漚一月或火熗皮逼反取乾蟲皆不生水浸之木更益柔韌周官曰仲冬斬陽木仲夏斬陰木鄭司農云陽木春夏生者陰木秋冬生者松柏之屬鄭玄曰陽木生山南者陰木生山北者冬則斬陽夏則斬陰調堅韌也按柏之性不生蟲蠹四時皆

得無所選也山中雒木自非七月四月兩時殺者率多生蟲無山南山北之異鄭若之說又無取則周官伐木蓋以順天道調陰陽未必為堅韌之與蟲蠹也

禮記月令孟春之月禁止伐木鄭玄注云為盛德所在也孟夏之月無伐大樹逆時氣也季夏之月樹木方盛乃命虞人入山行木無為斫伐為其未堅韌也季秋之月草木黃落乃伐薪為炭仲冬之月日短至則伐木取竹箭此其堅成之極時也孟子曰斧斤以時入山林材木不可勝用也趙岐注曰時為草木零落之時淮南

子曰草木未落時斧斤不入山林○崔寔曰自正月以終季夏不可伐木必生蠹蟲十一月伐竹木

四時類要十二月斬伐竹木不蛀

藥草

種紫草

齊民要術宜黃白輭良之地青沙地亦善開荒黍穄下大佳性不耐水必須高田秋耕地至春又轉耕之三月種之耧

耩地逐壠手下子良田一畝用子二升半薄田用子三升下訖勞之鋤如穀法潔淨爲佳其壠底草則拔之壠底用鋤則傷黍草九月中子熟刈之候桴芳蒲反燥載聚打取子濕載子則浥鬱即深細耕不細不深則失草矣尋壟以杷耬取整理收草宜併手力速竟爲良遲兩則損草也一把隨以茅結之擘高彌善四把爲一頭當日則斬齊顛倒十重許爲長行置堅平之地以板石鎮之令褊濕鎮直而長燥鎮則碎折不鎮賣難售也兩三宿豎頭著

日中曝之令浥浥然（不曝則鬱黑　太燥則碎折）五十頭作一洪（洪十字大頭向外以葛纏絡）著敞屋下陰涼處棚棧上其棚下勿使驢馬糞及人溺又忌烟皆令草失色其利勝藍若欲久停者入五月內著屋中閉戶塞向密泥勿使風入漏氣過立秋然後開出草色不異若經夏在棚棧上草便變黑不復任用

務本新書　種訖拖舤欏之或以輕鈍碾

過秋深子熟傍去其土連根取出就地鋪穧頓乾輕振其土芽葉束切去虛梢

紅花

花地欲得良熟二月末三月初種也種法欲雨後速下或漫散種或耧下一如種麻法亦有鋤掊而掩種者子科大而易料理花出日日乘涼摘取不摘則乾摘必須盡留餘即合

五月子熟拔曝令乾打取之子亦不用鬱浥

五月種晚花春初即留子入五月便種若待新花熟後取子則又

晚也

七月中摘深色鮮明耐久不黦紆物反色壞也勝春種者收子與麻子同價既任車脂亦堪為燭一頃花日須百人摘以一家手力十不充一但駕車地頭每旦當有小兒僮女十百為羣自來分摘正須平量中半分取是以單夫隻婦亦得多種

○曬紅花法摘取即碓擣使熟以水淘布袋絞去黄汁更擣以粟飯漿清而酸者淘之又以布袋絞去汁即收取染

紅勿弃也絞訖著甕器中以布蓋上雞鳴更擣令均於席上攤而曝乾勝作餅花作餅者不得乾令花浥鬱也

藍

藍地欲良三徧細耕三月中浸子令芽生乃畦種之治畦下水一同葵法藍三葉澆之晨夜再澆薅治令淨五月中新雨後即接濕耬耩拔栽之三莖作一科相去八寸栽時宜併功急手無令地燥也白背即急

鋤（栽時既濕白背不急鋤則堅確也）五徧為良七月中作藍澱○崔寔曰榆莢落時可種藍五月可刈藍六月可種冬藍（冬藍大藍也）

梔子

【新添】十月選成熟梔子取子淘淨曬乾至来春三月選沙白地斸畦區深一尺全去舊土却收地上濕潤浮土篩細填滿區下種稠密如種茄法細土薄糝上搭箔棚遮日高可一尺旱時一二日用

水於棚上頻頻澆灑不令土脉堅垎四十餘日芽方出土媷治澆溉至冬月厚用蒿草藏護次年三月移開相去一寸一科鋤治澆溉宜頻冬月用土深擁根株其枝梢用草包護至次年三四月又移一步半一科栽成行列須園內穿井頻澆頻鋤每歲冬須北面厚夾籬障以蔽風寒第四年開花結實十月收摘甑內微蒸過曬乾用

茶

【四時類要】熟時收取子和濕沙土拌筐籠盛之穰草盖不爾即凍不生至二月中出種之於樹下或北陰之地開坎圓三尺深一尺熟斸著糞和土每阬中種六七十顆子盖土厚一寸強任生草不得耘相去二尺種一方旱時以米泔澆此物畏日桑下竹陰地種之皆可二年外方可耘治以小便稀糞蠶沙澆擁之

又不可太多恐根嫩故也大縣宜山中帶坡峻若於平地即於兩畔深開溝壠洩水水浸根必死三年後收茶

椒

熟時收取黑子（俗名椒目不用人手數近捉之則不生也）四月初畦種之（治畦下水如種葵法）方三寸一子篩土覆之令厚寸許復篩熟糞以盖土上旱輒澆之常令潤澤生高數寸夏連雨時可移之移法先作小阬圓

深三寸以刀子圓劙椒栽合土移之於阬中萬不失一（若拔而移者率多死）若移大栽者二月三月中移之先作熟穰泥掘出即封根合泥埋之（行百餘里猶得生之）此物性不耐寒陽中之樹冬須草裹（不裹即死）其生小陰中者少禀寒氣則不用裹（所謂習以性成一木之性寒暑異容若朱藍之染能不易質故觀隣識士見友知人也）候實口開便速收之天晴時摘下薄布曝之令一日即乾色赤椒好（若陰時收者色黑失味）其葉

及青摘取可以為菹乾而末之亦足充事也

務本新書 三鄉椒種秋深熟時揀粒大者摘下蔭乾將椒子包裹掘地深埋春暖取出向陽掘畦種之性不耐寒冬月以草厚覆二年後春月移栽樹小時冬月以糞覆根地寒處以草裹縛次年結子椒不歇條一年繁勝一年

茱萸

齊民要術

食茱萸也山茱萸則不任食

二月三月栽之宜故城隄冢高燥處凡於城上種蒔者先宜隨長短掘壍停之經年然後於壍中種蒔保澤沃壤與平地無差不爾者土堅澤流長物至遲歷年倍多樹木尚小候實開便收之挂著屋裏壁上蔭乾勿使煙熏煙熏則苦而不香也用時去中黑子肉醬魚鮓偏宜用

茴香

務本新書

春暖向陽掘區糞土相和區先下水子用新香不浥者量地下子糝

土微蓋區南約量種蒜以遮夏日長高三四指旱則澆之或霖雨時就新子種之亦可十月所去條梢糞土覆根三月去之

蓮藕

齊民要術 種蓮子法八月九月中收蓮子堅黑者於凡上磨蓮子頭令皮薄取墐土作熟泥封之如三指大長二寸使蔕頭平重磨處尖銳泥乾時擲於泥中

重頭沉下自然周正皮薄易生少時即出其不磨者皮既堅厚倉卒不能生也

種藕法春初掘藕根節頭著魚池泥中種之當年即有蓮花

芡

齊民要術

種芡法一名雞頭八月中收取擘破取子散著池中自生也

芰

齊民要術

種芰法一名蔆秋上子黑熟

時收取散著池中自生矣

薯蕷今名山藥

四時類要山居要術云擇取白色根如白米粒成者先收子作三五所阬長一丈闊三尺深五尺下密布甎阬四面一尺許亦側布甎防别入傍土中根即細也作阬子訖填糞土三行下子種之填阬滿待苗著架經年已後根甚麤一阬可支一年食根種者截長一尺已下種

○又法地利經云大者折二寸為根種當年便得子收子後一冬埋之二月初取出便種忌人糞如旱放水澆又不宜苦濕須是牛糞和土種即易成

務本新書 種山藥宜寒食前後沙白地區長丈餘深闊各二尺少加爛牛糞與土相和平匀厚一尺揀肥長山藥上有芒刺者每定折長三四寸鱗次相挨卧於區内復以糞土匀覆五寸許旱則澆

之亦不可太濕頗忌大糞苗長以高梢扶架霜降後比及地凍出之外將蘆頭另窖來春種之勿令凍損

地黃

齊民要術

種地黃法須黑良田五徧細耕三月上旬為上時中旬為中時下旬為下時一畝下種五石其種還用三月中掘取者逐犂後下之至四月末五月初生苗訖至八月盡九月初根成中染

若須留爲種者即在地中勿掘之待來年三月取之爲種計一畝可收根三十石有草鋤不限徧數鋤時別作小刃鋤勿使細土覆心今秋收訖至來年更不須種自旅生也惟須鋤之如此得四年不要種之皆餘根自出矣

枸杞

博聞錄種枸杞法秋冬間收子淨洗日乾春耕熟地作町闊五寸紐草稕如臂

大置畦中以泥塗草稕上然後種子以細土及牛糞蓋令徧苗出頻水澆之○又可插種

務本新書枸杞宜故區畦種葉作菜食子根入藥

新添秋收好子至春畦種如種菜法○又三月中苗出時移栽如常法伏內壓條特為滋茂○一法截條長四五指許掩於濕土地中亦生

菊花

博聞錄 菊蜀人多種之苗可入茶花子入藥然野菊大能瀉人惟真菊延年花乃黃中之色氣味和正花葉根實皆長生藥其性介烈不與百花同盛衰是以通仙靈也

務本新書 宜白地栽甜水澆苗作菜食花入藥用三四月帶根土掘出作區下糞水調成泥擘根分栽每區一二科後

極滋亂

蒼朮

【四時類要】二月取根子劈破畦中種上糞下水一年即稠苗亦可為菜若作煎宜多種之

黃精

【四時類要】二月擇取葉相對生者是真黃精劈長二寸許稀種之一年後甚稠種子亦得其葉甚美入菜用其根堪為

煎术與黄精仙家所重

百合

四時類要二月種百合此物尤宜雞糞每阬深五寸如種蒜法又云取根曝乾擣為麪細篩甚益人

牛蒡子

四時類要熟耕肥地令深平二月末下子苗出後耘旱即澆灌八月已後即取根食若取子即留隔年方有子凡是閑地即須種之不但畦種也

務本新書牛蒡子宿根亦名鼠黏子葉

作菜食明目補中去風久食輕身耐老

決明

四時類要二月取子畦種同葵法葉生

便食直至秋間有子若嬾老畨種亦得

若入藥不如種馬蹄者

博聞錄園圃四旁宜多種虵不敢入

甘蔗

新添栽種法用肥壯糞地每歲春間耕

轉四徧耕多更好耬去桊草使地淨熟盖下土頭如大都天氣宜三月內下種迤南暄熱二月內亦得每栽子一箇截長五寸許有節者中須帶三两節㭊芽於節上畦寬一尺下種處㣲壅土高两邊低下相離五寸卧栽一根覆土厚二寸栽畢用水遶澆止令濕潤根脉無致渰沒栽封旱則三二日澆一徧如雨水調勻每一十日澆一徧其苗高二尺餘

頻用水廣澆之荒則鋤耘並不開花結
子直至九月霜後品嘗稭稈酸甜者成
熟味苦者未成熟將成熟者附根刈倒
依法即便煎熬外將所留栽子稭稈斬
去盡梢深掘窖院窖底用草襯藉將稭
稈竪立收藏於上用板盖土覆之毋令
透風及凍損直至來春依時出窖截栽
如前法大抵栽種者多用上半截儘堪
作種其下截肥好者留熬沙糖若用肥

好者作種尤佳○煎熬法若刈倒放十許日即不中煎熬將初刈倒稭稈去梢葉截長二寸碓擣碎用密筐或布袋盛頓壓擠取汁即用銅鍋內斟酌多寡以文武火煎熬其鍋隔牆安置牆外燒火無令烟火近鍋專一令人看視熬至稠粘似黑棗合色用瓦盆一隻底上鑽箸頭大竅眼一箇盆下用甕承接將熬成汁用瓢豁於盆內極好者澄於盆流於

甕內者止可調渴水飲用將好者上就用有窄眼盆盛頓或倒在瓦罌內亦可以〻物覆盖之食則從便慎勿置於熱炕上恐熱開化大抵煎熬者止取下截肥好者有力糖多若連上截用之亦得

薏苡

新添 九月霜後收子至來年三月中隨耕地於壠內點種撈盖令平有草則鋤

藤花

新添 春分前後移栽長時宜靠樹架起其花茂盛採時天晴便乾不致浥損收藏可為素餡食之

薄荷

新添 諸處多見移栽經冬根不死採葉可食本入藥用

罌粟 一名御米

四時類要 罌粟尤宜山坡亦可畦種

務閑錄 重九日種又中秋夜種則罌大

子滿種訖以竹箒掃之

苜蓿

齊民要術 地宜良熟七月種之畦種水澆一如韭法亦一剪一上糞鐵杷耧土令起然後下水一年三刈留子者一刈則止春初既中生噉爲羮甚香長宜飼馬馬尤嗜之此物長生種者一勞永逸都邑負郭所宜種之

○崔寔曰七月八月可種苜蓿

四時類要 苜蓿若不作畦種即和麥種

之不妨○燒苜蓿之地十二月燒之訖
二年一度耕壠外根即不衰凡苜蓿春
食作乾菜至益人

農桑輯要卷第六

農桑輯要卷第七

孳畜

養馬牛總論

齊民要術 服牛乘馬量其力能寒温飲飼適其天性如不肥充蕃息者未之有也諺曰羸牛劣馬寒食下（言其乏食瘦瘠春中必死）務在充飽調適而已

馬（驢騾附）

齊民要術 飲飼之節食有三芻飲有三

時何謂也一曰惡芻二曰中芻三曰善芻謂飢時與惡芻飽時與善芻引之令食食常飽則無不肥剉草雖足豆穀亦不肥充細剉無節簁去土而食之者令馬肥不空如此喂飼自然好也空苦江反何謂三時一曰朝飲少之二曰晝飲則胥饜水三曰暮極飲之一曰夏汗冬寒皆當節飲諺曰旦起騎穀日中騎水斯言旦飲須節水也每飲食令行驟則消水小驟數百步亦佳十日一放令其陸梁舒展令馬硬食也

驢騾大槩類馬不復別起條端○凡驢馬駒初生忌灰氣遇新出爐者輒死經雨

即不死○凡以豬槽餵馬以石灰泥馬槽

汗繫著門皆令馬落駒術曰常繫獼猴於馬房令馬不

畏辟惡消百病也○馬久步即生筋勞筋勞則

生蹄痛久立則發骨勞骨勞則發癰腫

久汗不乾則皮勞皮勞者驏而不振汗

未善燥而飲飼之則生氣勞氣勞者驏

而不噴驅馳無節則生血勞血勞則發

強行何以察五勞終日驅馳舍而視之

不驏者筋勞也驏而不時起者骨勞也

起而不振者皮勞也振而不噴者氣勞也噴而不溺者血勞也筋勞者兩絆却行三十步而已骨勞者令人牽之起從後筈之起而已皮勞者夾脊摩之熱而已氣勞者緩繫之櫪上逺餧草噴而已血勞者高繫無飲食之大溺而已○治牛馬疫氣方取獺屎煮灌之獺肉及肝彌良不能得肉肝乃用屎耳

三月收合龍駒合驢馬之牝

牡此月三日爲上準令季春之月乃合騾牛驢馬遊牝于牡仲夏之月遊牝別羣則縶騰駒○治馬喉腫方以物纏刀子露刃鋒一寸許刺咽喉潰則愈又方取乾馬糞置瓶子中頭髮覆之火燒馬糞及髮煙出著馬鼻熏令煙入鼻中須臾即差又方豬脊引脂亂髮燒烟熏鼻同上法○又療馬結熱起臥戰不食水草方黃連二兩杵末白鮮皮一兩杵末油五

合豬脂四兩細切右以溫水一升半和藥調停灌下牽行拋糞即愈○馬疥方𦣻音臭黃頭髮臘月豬脂煎令髮消及熱塗之立効○馬傷水用葱鹽油相和搓成團子內鼻中以手掩馬鼻令不通氣良久待眼淚出即止○馬傷料用生蘿蔔三五箇切作片子啖之効○馬猝熱腹脹起卧欲死方藍汁二升和冷水二升灌之立効○治新生小駒子瀉肚方藁

本末三錢匕大麻子研汁調灌下咽喉便效次以黄連末大麻汁觧之○驢馬磨打破瘡馬齒菜石灰一處擣為團曬乾後再擣羅為末先口含鹽漿水洗淨用藥末貼之驗○常啖馬藥欝金大黄甘草山梔子貝母白藥子黄藥子黄芩款冬花秦艽黄蘗黄連知母桔梗藁本右件一十五味各等分同擣羅為末每一疋馬每啖藥末二兩許仍用油蜜豬

脂雞子飯少許同和調啖之啖後不得飲水至夜
喂飼○馬氣藥方青橘皮當歸桂心大黃
芍藥木通郁李仁瞿麦白芷牽牛子右
件十味各等分同擣羅爲末用温酒調
灌每疋馬藥末半兩○點馬眼藥青鹽
黃連馬牙硝蕤仁右件四味各等分同
研爲末用蜜煎入瓷瓶子盛或點時旋
取少多以井水浸化點○治馬急起卧
取壁上多年石灰細杵羅用酒調二兩

已来灌之立効○治馬食槽内草結方

好白礬末一两分為二服每貼和飲水

後啖之不過三两度即内消却此法神

驗

馬傷脾方川厚朴去麄皮為末

同薑棗煎灌應脾胃有傷不食水草褰

唇似人笑鼻中氣短宜速與此藥○馬心

熱方甘草芒硝黄蘖大黄山梔子瓜蔞

為末水調灌應心肺壅熱口鼻流血跳

躑煩燥宜急與此藥○馬肺毒方天門冬知母貝母紫蘇芒硝黃芩甘草薄荷葉同末飯湯入少許醋調灌療肺毒熱極鼻中噴水○馬肝壅方朴硝黃連為末男子頭髮燒灰存性漿水調灌應邪氣衝肝眼目似睡忽然眩倒此方主之○馬腎搐方烏藥芍藥當歸玄參山茵蔯白芷山藥杏仁秦艽每服一兩酒一大升同煎溫灌隔日再灌○馬氣喘方

玄參亭藶升麻牛蒡兜苓黃耆知母貝母同爲末每服二兩漿水調草後灌之應喘嗽皆治○馬尿血方黃耆烏藥芍藥山茵蔯地黃兜零枇杷葉爲末漿水煎沸候冷調灌應卒熱尿血皆主療之○馬喉腫方螺青川芎知母川鬱金牛蒡炒薄荷貝母同爲末每服二兩蜜二兩漿水煎沸候温調灌○馬結尿方滑石朴硝木通車前子爲末每服一兩温

水調灌陽時再服結甚則加山梔子赤
芍藥同末○馬結糞方皂角燒灰存性
同大黃枳殼麻子仁黃連厚朴為末清
米泔調灌若腸实加蔓荊子末同調○
馬舌硬方款冬花瞿麦山梔子地仙草
青黛鵬砂朴硝油煙墨等分為細末每
用半兩許塗舌上立差○馬膈痛方羌
活白藥甜瓜子當歸沒藥芍藥為末春
夏漿水加蜜秋冬小便調療膈痛低頭

難不食草○馬流沫方當歸菖蒲白术澤瀉赤石脂枳殼厚朴甘草為末每一兩半酒一升葱白三握同水煎溫灌○馬傷蹄方大黃五靈脂木鼈子去油海桐皮甘草土黃芸薹子白芥子為末黃米粥調藥攤帛上裹之

牛 附水牛

治牛疫方取人参細切水煮汁五升灌口中差又方真安息香於牛

欄中燒如燒香法如初覺有一頭至兩頭是疫即牽出以鼻吸之立愈又方十二月兎頭燒作灰和水五升灌口中良○牛欲死腹脹方研麻子汁五升温令熱灌口中愈此治食生豆脹垂死者甚良○牛鼻脹方以醋灌耳中立差○牛疥方煮烏豆汁熱洗五度差（一本作烏頭汁）○牛肚脹及嗽方取榆白皮水煮令熟甚滑以三五升灌之即差○牛虱方以胡

麻油塗之即愈豬肚亦得六畜虱塗之亦愈

博聞錄 牛瘴疫方用真茶二兩和水五升灌之又治牛卒疫而動頭打脇急用巴豆七箇去殼細研出油和灌之即愈又燒蒼朮令牛鼻及其香止○牛尿血方川當歸紅花爲細末以酒二升半煎取二升冷灌之又法豉汁調食鹽灌○牛患白膜遮眼用炒鹽并竹節燒存性

細研一錢貼膜効○牛氣噎方牛有茅根噎以皂角末吹鼻中更以鞋底拍尾停骨下効○牛腹脹方牛喫著雜蟲致腹脹用燕屎一合漿水二升調灌之効○牛觸人方牛顛走逢人即觸是膽大也黃連大黃末雞子酒調灌之○牛尾焦不食水草以大黃黃連白芷末雞子酒調灌之○牛氣脹方淨水洗汗韉取汁一升好醋半升許灌之愈○牛肩爛

方舊綿絮三兩燒存性麻油調抹忌水五日愈○牛漏蹄方紫礦為末豬脂和納入蹄中燒鐵篦烙之愈○牛沙疥方蕎麦隨多寡燒灰淋汁入緑礬一合和塗愈

韓氏直說 餵養牛法農隙時入暖屋用場上諸糠穰鋪牛脚下謂之牛鋪牛糞其上次日又覆糠穰每日一覆十日除一次牛一具三隻每日前後餉約飼草

三束豆料八升或用蠶沙乾桑葉水三桶浸之牛下飼噍透刷飽飲畢辰巳時間上槽一頓可分三和皆水拌第一和草多料少第二比前草減半少加料第三草比第二又減半所有料全繳拌食盡即往使耕噍了牛無力夜餵牛各帶一鈴草盡牛不食則鈴無聲即拌之飽使耕俗諺云三和一繳須管要飽不要噍了使去窮好○水牛飲飼與黃牛同

夏須得水池冬須得暖廠牛衣

羊

齊民要術常留臘月正月生羔為種者上十一月二月生者次之非此月數生者毛必焦卷骨髓細小所以然者逢寒遇熱故也其八九十月生者雖值秋肥然比至冬暮母乳已竭春草未生是故不佳其三四月生者草雖茂美而羔小未食常飲熱乳所以亦惡五六七月生者兩熱相仍此惡中之甚其十一月十二月生者母既含重膏軀充滿草雖枯亦不羸瘦母乳適盡即得春草是以極佳大率十口二羝羝少則不孕羝多則亂羣不孕者必瘦瘦則匪為不蕃息經冬

或死羝無角者更佳有角者喜相觝觸傷胎所由也擬供廚者宜剩之剩法生十餘日布裹齒碎之牧羊必須大老子心性宛順者起居以時調其宜適卜式云牧民何異於是者若使急性人及小兒者攔約不得必有打傷之災或勞戲不看則有狼犬之害懶不驅行無肥充之理將息失所有羔死之患也惟遠水為良傷水則蹄甲膿出二日一飲頻飲則傷水而鼻膿緩驅行勿停息息則不食而羊瘦急行則坌塵而蚛顙也春夏早放秋冬晚出春夏氣軟所以宜早秋冬霜露所以宜晚養生經云春夏早起與雞俱興秋冬

晏起必待日光此其義也夏日處暑須得陰涼處日中不避熱則塵汗相漸秋冬之間必致癬疥七月已後霜露降必須日出霜露晞解然後放之不爾則逢毒氣令羊口瘡腹脹也

圈不厭近必須與人居相連開窗向圈所以然者羊性怯弱不能禦物狼一入圈或能絕羣架北牆爲廠爲屋即傷熱熱則生疥癬且屋處慣暖冬月入田尤不耐寒圈中作臺開竇無令停水二日一除毋使糞穢穢則污毛停水則夾蹄眠濕則腹脹也圈內須並牆豎柴柵令周匝羊不揩土毛常自淨不豎柴者羊揩牆壁土鹹相得毛皆成氈又豎柵頭出牆者虎狼不敢踰也羊一

千口者三四月中種大豆一頃雜穀并草留之不須鋤治八九月中刈作青茭若不種豆穀者初草實成時收刈雜草薄鋪使乾勿令鬱浥豐豆胡豆蓬藜荆棘為上大小豆萁次之高麗豆萁尤是所便蘆薍二種則不中凡乘秋刈草非直為羊然大凡悉皆倍勝崔寔曰七月七日刈芻茭也既至冬寒多饒風霜或春初雨落青草未生時則須飼不宜出放○羊有疥者間別之不別相染汙或能合羣致死羊疥先著口者難治多

死凡羊經疥得差後夏初肥時宜賣易之不爾後春疥發必死矣○家政法曰養羊法當以瓦器盛一升鹽懸羊欄中羊喜鹽自數還啖之不勞人牧○羊有病輙相汙欲令別病法當欄前掘瀆深二尺廣四尺往還皆跳過者無病不能過者入瀆中行過便別之○羊有一角食之傷人

羊疥方藜蘆根敲打令皮破

以泔浸之餅盛塞口放竈邊令常暖數日味酸便中用以軓瓦刮疥處令赤若堅硬者湯洗之去痂拭令乾以藥汁塗之再上愈疥若多逐日漸漸塗之勿以頓塗恐不勝痛也又方豬脂和臭黃塗之愈○羊中水方羊膿鼻眼不淨者皆以水澆治之其方以湯和鹽杓中研令極鹹候冷取清者以小角子受一雞子者灌兩鼻各一角五日後必肥以眼鼻為

候不差更灌○羊膿鼻方羊膿鼻及口頰生瘡如乾癬者相染多致絕羣治法豎長竿圈中竿頭致板令獼猴居上辟狐狸而益羊差病也○羊夾蹄方取羖羊脂和薫令熟燒鐵令微熱勻脂烙之勿令入泥水不日自差○剪羊毛三月候毛床動則剪剪訖以河水洗即生毛潔白八月候子未成時剪之不爾則損毛中旬後剪則勿洗恐寒氣損羊

豬

母豬取短喙無柔毛者良喙長則牙多一廂三牙已上則不煩畜為難肥故有柔毛者爓治難淨也牝者子母不同圈子母同圈喜相聚不食則死傷牡者同圈則無嫌牡性游蕩若非家生則喜浪失圈不厭小圈小則肥疾處不厭穢泥汙避暑則亦須小廠以避雨雪春夏草生隨時放牧糟糠之屬當日別與糟糠經夏輒敗不中停故八九十月放而不飼所有糟糠則畜待窮冬春初豬性甚便水生之草

杷耬水藻等令近岸豬則食之皆肥初產者宜煮穀飼之其子三日便掐尾六十日後犍三日掐尾則不畏風凡犍豬死者皆、風所致耳犍不截尾則前大後小犍者骨細肉多不犍者骨麤肉少如犍牛法者無風死之患十一月十二月生者豚一宿蒸之蒸法索籠盛豚著甑中微火蒸之汗去便罷不蒸則腦凍不合不出旬便死所以然者豚性腦少寒盛則不能合煖故須煖氣助之供食豚乳下者佳簡取別飼之愁其不肥共母同圈粟豆難足宜埋車輪為食場散粟豆於內小

豚食足出入自由則肥速

四時類要 閹豬了待瘡口乾平復後取巴豆兩粒去殼爛擣和麻籸糟糠之類飼之半日後當大瀉其後日見肥大○肥豕法麻子二升擣十餘杵鹽一升同煮後和糠三斗飼之立肥

禽魚

養雞

齊民要術 雞種取桑落時生者良形小淺毛

脚細短者是也守窠少聲善育雛子春夏生者則不佳形大毛羽悅澤脚麤長者是遊蕩饒聲產乳易厭既不守窠則無緣蕃息也雞春夏雛二十日內無令出窠飼以燥飯出窠早不免烏鴟與濕飯則令臍膿也雞棲宜據地為籠籠內著棧雖鳴聲不朗而安穩易肥又免狐狸之患若任之樹大一遇風寒大者損瘦小者或死燃柳柴殺雞雛小者死大者盲此亦燒黍穰殺瓠之流其理難悉○家政法曰養雞法二月先耕一畝作田秫粥洒

之刈生茅覆上自生白蟲便買黃雌雞十隻雄一隻於地上作屋方廣丈五於屋下懸簀令雞宿上夏月盛晝雞當還屋下息并於園中築作小屋覆雞得養子烏不得就○養雞令速肥不爬屋不暴園不畏烏鴟狐狸法別築牆匡開小門住小廠令雞以避雨日雌雄皆斬去六翮無令得飛出常多收秕稗胡豆之類以養之亦作小槽以貯水荆藩為棲去地一尺數掃去屎鑿廧為窠亦去地一尺惟冬天著草不茹則子凍春夏秋三時則不須直置土上任其產伏[illegible]草則蛆蟲生雛出

則著外以單籠之如鶴鶉大還內廧匡中其供食者又別作廧匡蒸小麥飼之三七日便肥大矣

○取穀產雞子供常食法別取雌雞勿令與雄相雜其廧匡斬翅荊棲土窠一如前法多與穀令竟冬肥盛自然穀產矣一雞生百餘卵不雛並食之無咎

○黑雞白頭食之病人有六指者殺人養生論曰雞肉不可令小兒食食之生蚘蟲又令體消瘦

鵝鴨

鵝鴨並一歲再伏者為種一伏

得子者少三伏者冬寒雛多死也大率鵞三雌一雄鴨五雌一雄鵞初輩生子十餘鴨生數十輩輩皆漸少矣常足五穀飼之生子多不足者生子少欲於厰屋之下作窠以防猪犬狐貍驚恐之患多著細草於窠中令煖先刻白木為卵形窠別著一枚以誑之不爾不肯入窠喜東西浪生若獨著一窠後有爭窠之患生時尋即收取別著一煖處以柔細草覆藉之停置窠中凍即雛死伏時大鵞一十子大鴨二十子小者減之多則不周數起者

不任為種（數起則凍冷也）其貪伏不起者須五六日一與食起之令洗浴（久不起者飢羸身冷雖伏無熱）鵞鴨皆一月雛出量雛欲出之時四五日內不用聞打鼓紡車大叫豬犬及舂聲又不用器淋灰不用見新産婦（觸忌者雛多厭殺不能自出假令出亦尋死也）雛既出作籠籠之先以粳米為粥糜一頓飽食之名曰塡嗉（不爾噎蘇虛羌量而死）然後以粟飯切苦菜蕪菁英為食以清水與之濁則易（不易泥塞鼻則

死入水中不用停久尋宜驅出此既水禽不得水即死臍未合久在水中冷微亦死於籠中高處敷細草令寢處其上雛小臍未合不欲冷也十五日後乃出籠早放者匪直乏力致困又有寒冷兼烏鴟災也鵞惟食五穀稗子及草菜不食生蟲舊洪方曰居射工之地當養鵞鵞見此物能食之故鵞辟此物也鴨靡不食矣水稗實成時尤是所便噉此足得肥充供廚者子鵞百日以外子鴨六七十日佳過此肉硬大率鵞鴨六年以上老不復生

伏矣宜去之少者初生伏又未能工惟數年之中佳耳○純取雌鴨無令雜雄足其粟豆常令肥飽一鴨便生百卵俗所謂穀生者此卵既非陰陽合生雛伏亦不成雛宜以供膳幸無麛卵之咎也

魚

陶朱公養魚經曰夫治生之法有五水畜第一水畜所謂魚池也以六畝地爲池池中作九洲求懷子鯉魚長三尺者二十頭牡鯉魚長三尺者四

頭以二月上庚日内池中令水無聲魚
必生至四月内一神守六月内二神守
八月内三神守神守者鼈也所以内鼈
者魚滿三百六十則蛟龍為之長而將
魚飛去内鼈則魚不復去在池中周遶
九洲無窮自謂江湖也至來年二月得
鯉魚長一尺者一萬五千枚三尺者四
萬五千枚二尺者萬枚至明年得長一
尺者十萬枚長二尺者五萬枚長三尺

者五萬枚長四尺者四萬枚留長二尺
者二千枚作種所餘皆貨候至明年不
可勝計也池中有九洲八谷谷上立水
二尺又谷中立水六尺所以養鯉者鯉
不相食易長又貴也〇又作魚池法三
尺大鯉非近江湖倉卒難求若養小魚
積年不大欲令生大魚法須載取藪澤
陂湖饒大魚之處近水際土十數載以
布池底二年之内即生大魚蓋由土中

先有大魚子得水即生也

蜜蜂

新添 人家多於山野古窯中收取盖小房或編荊囤兩頭泥封開一二小竅使通出入另開一小門泥封時時開却掃除常淨不令他物所侵秋花彫盡留冬月可食蜜脾割取作蜜蠟至春三月掃除如前常於蜂窠前置水一器不致渴損春月蜂成有數箇蜂王當審多少壯

與不壯若可分爲兩窠止留蜂王兩箇其餘摘去如不壯除舊蜂王外其餘蜂王盡行摘去窠烏禾反穴居也

歲用雜事


四時類要○正月○竪籬落○糞田○開荒○修蠶屋○織蠶箔○造桒机○造麻鞋○舂米此月人閑○築牆○二月○栽柳○舒蒲桃上架○解栗裹縛○去石榴裹縛○造醬是月合爲中時○寒食前後

收柴炭○造布○浣冬衣○採桑螵蛸○三月○利溝瀆○葺垣墻○治屋室以待霖雨○脫墼○移茄子○造酪是月牛羊飽草好造也○四月○收蔓菁芥蘿蔔䓁子○收乾椹子○鋤葱○收乾笋藏笋○此月伐木不蛀○脩隄防開水竇○整屋漏以備暴雨○五月○灰藏毛羽物○氊須人卧不卧則曬箒掃○收蠶種豌豆蜀芥胡荽子○六月○命女

工織紬絹○收芥子（中秋後種）○收花藥子（便種之）○收李核（便種）○收苜蓿○收槐花（曝乾）○斫竹（此月及八月不蛀）○漚麻○曬氊褥書裘○種小蒜（同七月）蘿蔔○七月○收楮子○浣故衣制新衣作夾衣以備始涼○刈蒿草○種蜀芥○分蘿○漚晚麻○耕菜地○收荷葉陰乾○拭漆器五月至此月盡經雨後漆器圖畫箱篋須曬乾則不損○收瓜蔕○收萎蕤子

同月〇八月〇收薏苡〇收角蒿〇收韭花〇收胡桃〇收棗〇開蜜〇下旬造油衣〇收油麻秫江豆〇備冬衣〇刈莞葦〇九月〇收豕同月十〇收早角〇貯麻子油〇採菊花收木瓜〇備冬藏凡蔓菁莛蓼韭葷脆美而不耐停著旱園菜稍硬停得至二月〇十月〇築垣牆墐北户〇縛薦〇遮掩牛馬屋〇收槐實楮實〇收牛膝地黄〇造牛衣

○鹽瘞蒲桃○包裹栗樹石榴樹不爾即凍死○收諸般穀種大小豆種○十一月○貨薪柴綿絮○伐木取竹箭此月堅成○造什物農具○折麻放麻○刈蒿棘○貯年支草於隙地至六月及秋霖時俱利倍○十二月○造車○貯雪水○收臘糟○糞地○刈棘屯牆○造農器○收羔種○收牛糞


農桑輯要卷苐七